



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO

Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO IT5320005 (AB20) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000

0 125 250 500
Metri


SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
BIONDI Edoardo
CASAVECCHIA Simona
ANGELINI Elia
BIANCHELLI Maurizio
PESARESI Simone
PINZI Morena

COORDINATE VERTICI		
GAUSS-BOAGA FUSO EST		
VERTICI	N	E
NO	4530496	2400751
NE	4530496	2406955
SO	4523883	2400751
SE	4523883	2406955

Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2005-2006

QUADRO D'UNIONE SEZIONI 1:10000



 Confine SIC proposto

 Confine SIC vigente

LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 490 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 30 Ha

 91A* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2- Bosco di roverella
Ass: Riso sempervirente Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. quercetosum pubescentis Allegrezza et al. 2002
Superficie stimata dell'habitat 3 Ha (10%)

 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
7- Prateria annuale terfida a salicella erbacea e rovesello marittimo
Ass: Salicetum Kali-Cakileum maritima Costa & Mansueti 1981
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (3,3%)

 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1- Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco
Agr: a Populus nigra o Populus alba o Salix alba
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

 93A0 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3- Bosco di leccio
Ass: Cephalanthro longifolia-Quercetum ilici Biondi & Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignatelli & Venanzoni 2002
subass. latifoliosum veneti Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
4- Bosco di leccio
Ass: Cyclotermis hederifolia-Quercetum ilici Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
subass. cyclaminetosum hederifolia Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (3,3%)

 HABITAT DISPOSTI A MOSAICO
15- Mosaico di vegetazione marina
si rinvergono i seguenti habitat:
1160 Grandi cale e baie poco profonde
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Vegetazione sommersa alofila a zostera maggiore
Ass: Zosteretum marinae (Borger 1905) Den Hartog & Segal 1964
Superficie stimata dell'habitat 8 Ha (26,7%)
1170 Scogliere
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Popolamenti algali
Superficie stimata dell'habitat 16 Ha (53,3%)

 6- Mosaico di vegetazione delle scogliere
si rinvergono i seguenti habitat:
1170 Scogliere
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Popolamenti algali
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (3,3%)
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Vegetazione della classe Critmo-Limonietea
Agr: a Critmo-Limonietea
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

Allegamento cartografico ed elaborazioni GIS (software: ESRI ArcMap 9.0); Simone Pesenti

Base topografica derivata da CTR 1:10000 Regione MARCHE, opportunamente ridisegnata

Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

ANCONA, 16/05/2009

