



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO

Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC GOLA DELLA ROSSA IT5320004 (AB27) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000



0 125 250 500 Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

	GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N	E
NO	4814133	2354901
NE	4814133	2361085
SO	4807520	2354901
SE	4807520	2361085

AUTORI:
BIONDI Edoardo
ANGELINI Elia
GALASSI Simone
PESARESI Simone
PINZI Morena

Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2006-2007



LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 1351 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 366 Ha

 6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedon albi si rinvengono nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Gariga a santareggia montana
Ass. Ceanotho-nucantho-Salixetum montanae Alegrezza, Biondi, Fornica & Baielli 1997
subass. capitulatum-nucantho subass. nova
Superficie stimata dell'habitat 16 Ha (4,4%)

 6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea si rinvengono nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
10 - Prateria a forasacco a stella purpurea
Ass. Asperulo-purpureo-Brometum erecti Biondi & Baielli ex Biondi, Baielli, Alegrezza & Zuccarelli 1995
Ass. Asperulo-purpureo-Brometum erecti Biondi & Baielli ex Biondi, Baielli, Alegrezza & Zuccarelli 1995
Superficie stimata dell'habitat 4 Ha (1,1%)

 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuca-Brometalia) (notevoli fioriture di Orchidea)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
10 - Prateria a forasacco a stella purpurea
Ass. Asperulo-purpureo-Brometum erecti Biondi & Baielli ex Biondi, Baielli, Alegrezza & Zuccarelli 1995
11 - Prateria a forasacco comune e sonagli comuni
Ass. Brizo-medio-Brometum erecti Biondi & Baielli ex Biondi, Baielli, Alegrezza & Zuccarelli 1995
12 - Prateria a forasacco comune e foradito brattato
Ass. Ceanotho-practico-Brometum erecti Biondi, Baielli, Alegrezza & Zuccarelli 1995
Superficie stimata dell'habitat 104 Ha (23,4%)

 91A4* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco di roverella
Ass. Roso-sempervivento-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. quercetum pubescentis Alegrezza et al. 2002
4 - Bosco di roverella con scotone
Ass. Roso-sempervivento-Quercetum pubescentis Biondi 1986
subass. cotinellum coccigero-Alegrezza, Baielli, Biondi & Taffetani 2002
Superficie stimata dell'habitat 105 Ha (23,7%)

 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
5 - Bosco ripariale a rovo e salice bianco
Ass. Salic-umbrato-Salicion albae Alegrezza, Biondi & Felio 2006
Superficie stimata dell'habitat 17 Ha (4,6%)

 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Arbusteto di ginestra e cisto a foglie sessili con ginestra onice
Ass. Sparto-juncet-Cytisetum sessilifolii Biondi, Alegrezza & Guttan 1988
var. a Juniperus oxycedrus
2 - Arbusteto di ginestra e cisto a foglie sessili con abbondante ginestra comune
Ass. Sparto-juncet-Cytisetum sessilifolii Biondi, Alegrezza & Guttan 1988
var. a Juniperus communis ssp. communis
Superficie stimata dell'habitat 8 Ha (2,2%)

 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
13 - Bosco ripariale a stoppa nera
Ass. Salic-aba-Populetum nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936
subass. populetum nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936
Superficie stimata dell'habitat 12 Ha (3,3%)

 93A0 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
7 - Bosco di leccio
Ass. Cyclomino-nedertali-Quercetum ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
subass. cyclomino-nedertali Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 82 Ha (22,4%)

 91M0 Foreste pannoniche-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Bosco di cerro
Ass. Lonicero-vibetati-Quercetum ceris (Taffetani & Biondi 1995) Biondi & Alegrezza 1996
Superficie stimata dell'habitat 18 Ha (4,9%)

 HABITAT DISPOSTI A MOSAICO
9* Mosaico di vegetazione rupicola
si rinvengono i seguenti habitat:
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofila
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Vegetazione casmofila a mercurio papulosa
Ass. Mercurio-papulosa-Potentillietum caulescentis Biondi & Baielli 1982
Vegetazione casmofila a saxifraga callosa
Ass. Saxifraga-australis-Triestetum verticillati Biondi & Baielli 1982
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

 Confine SIC proposto

 Confine SIC vigente

 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
(Dati del Catasto Speleologico Regionale: Istituto con L.R. 12/2000 e gestito dalla Federazione Speleologica Marchigiana).