




UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO



Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC MONTE NERO, SERRA SANTA IT5320014 (AB40) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000




SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
BIONDI Edoardo
FERRONI Elisabetta
NANNI Lucia
PESARESÌ Simone
PINZI Morena


Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2004-2005

COORDINATE VERTICI			
		GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N	E	
NO	4781294	2343118	
NE	4781294	2346667	
SO	4785674	2343118	
SE	4785674	2346667	

QUADRO D'UNIONE SEZIONI 1:10000



Confine SIC proposto Confine SIC vigente



LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 650 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 353 Ha

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
9 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballesi ex Biondi, Ballesi, Allegrezza & Zuccarello 1995
Superficie stimata dell'habitat 4 Ha (1,1%)

6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
9 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballesi ex Biondi, Ballesi, Allegrezza & Zuccarello 1995
11 - Prateria a forasacco e cinquefoglia di Tommasini
Ass. *Potentillo cineræae-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *potentillototum cineræae* Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 6 Ha (1,7%)

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
9 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballesi ex Biondi, Ballesi, Allegrezza & Zuccarello 1995
10 - Prateria a forasacco comune e sonaglini comuni
Ass. *Brizo mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballesi 1982
11 - Prateria a forasacco e cinquefoglia di Tommasini
Ass. *Potentillo cineræae-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *potentillototum cineræae* Biondi et al. 2004
12 - Prateria con sesleria dei macereti e forasacco
Ass. *Seslerio nitidae-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli 1968
Superficie stimata dell'habitat 156 Ha (44,2%)

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Bosco di acero di monte,iglio nostrano e olmo di montagna
Ass. *Aceretum obtusati-pseudoplatani* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
Superficie stimata dell'habitat 2 Ha (0,6%)

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
5 - Bosco ripariale a rovo e salice bianco
Ass. *Rubio ulmifolii-Salicetum albae* Allegrezza, Biondi & Felici 2006
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

9210* Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco termofilo, neutro-basilfo di faggio
Ass. *Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyretotum veneti* Biondi et al. 2002
4 - Bosco termofilo, neutro-basilfo di faggio con farnaccio
Ass. *Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyretotum veneti* Biondi et al. 2002
var. a *Sorbus aria*

Superficie stimata dell'habitat 148 Ha (41,9%)

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Arbusteto di ginestra e cisto a foglie sessili con ginepro rosso
Ass. *Spartio juncei-Cystacetum sessilifolii* Biondi, Allegrezza & Gullian 1988
var. a *Juniperus oxycedrus*
Superficie stimata dell'habitat 5 Ha (1,4%)

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
7 - Bosco di cerro
Ass. *Cerici sylvaticae-Quercetum cerris* Catorci & Orsomanzi 2001
Superficie stimata dell'habitat 30 Ha (8,5%)

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco
Aggr. a *Populus nigra* o *Populus alba* o *Salix alba*
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (0,3%)

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Bosco di leccio
Ass. *Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis* Biondi & Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignatelli & Venanzoni 2002
subass. *lathyretotum veneti* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (0,3%)

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
(Dati del Catasto Speleologico Regionale, istituto con L.R. 12/2000
e gestito dalla Federazione Speleologica Marchigiana)

Confine SIC proposto
Confine SIC vigente