

Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC MONTE SAN VICINO
IT5330015 (AB34)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000




AUTORI: SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

BIONDI Edoardo
ALLEGREZZA Marina
ANGELINI Elia
GALASSI Simone
PESARESI Simone
VENTRONE Fulvio


COORDINATE VERTICI		
	GAUSS-BOGA FUSO EST	
VERTICI	N	E
NO	4802102	2360550
NE	4802102	2366734
SO	4796485	2360550
SE	4796485	2366734

Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2006-2007

**QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000**



Confine SIC proposto Confine SIC vigente



LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 875 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 560 Ha

6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea si rinvengono nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:

7 - Praterie a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarelli 1995

11 - Praterie a forasacco e cinquefoglia di Tommasini
Ass. *Potentillo cinereae-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *potentillotum cinereae* Biondi et al. 2004

Superficie stimata dell'habitat 3 Ha (0,5%)

6210* Formazioni erose secche semiumifere e fessie coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)

comprende le seguenti specie e sottospecie:

7 - *Prunella* a forosacco e stellata purpurea

8 - *Prunella* purpurea (Biondi e Biondi & Ballei ex Biondi, Ballei, Alegrezza & Zuccheri 1995)

9 - *Prunella* a forosacco comune e songiolini comuni

Ass. *Brya media-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli cor. Biondi & Ballei 1982

Ass. *Prunella* a forosacco comune e songiolini comuni

Ass. *Brya media-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli cor. Biondi & Ballei 1982

Ass. *Prunella* a forosacco comune e songiolini comuni

Ass. *Brya media-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli cor. Biondi & Ballei 1982

10 - *Cynodon* cristata

10 - *Prunella* a forosacco comune e forosallo bratteato

Ass. *Cerastium bracteatum-Brometum erecti* Bruno, Ballei, Alegrezza, Guttari & Taffetani 1986

11 - *Prunella* a forosacco e *Cynodon* cristata

Ass. *Potentilla cinerea-Brometum erecti* Bruno, Pirezi & Gubellini 2004

subsp. *potentillifolia* (Biondi & Biondi ex Biondi et al. 2004)

Superficie stimata dell'habitat 154 Ha (27,5%)

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Bosco di acero di monte, tiglio nostrano e olmo di montagna
Ass. *Aceretum obtusati-pseudoplatani* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Alleg.
Superficie stimata dell'habitat 3 Ha (0.5%)

91AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco di roverella con cisto a foglie sessili
Ass. *Cytis sessilifolius-Quercetum pubescens* Blasl, Feoli & Avena 198
Superficie stimata dell'habitat 4 Ha (0.7%)

9210* Faggeti dell'Appennino con *Taxus* ed *Ilex*
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:

- 1 - Bosco termofilo, neturo-basilifio di faggio
- Ass. *Lathyrus veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
- subass. *Lathyrus veneti* Biondi et al. 2002
- 5 - Bosco di faggio
- Ass. *Hieracio racemosi-Fagetum sylvaticae* Allegrezza 2003
- 6 - Bosco di faggio con erica
- Ass. *Hieracio racemosi-Fagetum sylvaticae* Allegrezza 2003
- subass. *ericetosum arboreae* Allegrezza 2003

Superficie stimata dell'habitat 388 Ha (69,3%)

91M0 Foreste pannonicobalcaniche di quercia cerro-quercia sessili
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Bosco di cerro con faggio
Ass. Acer obtusati-Quercetum ceris Ubaldi & Speranza 1982
subass. fagetosum sylvaticae Allegrezza 2003
Superficie stimata dell'habitat 8 Ha (1,4%)

Confine SIC property

☐ Confine SIC vigente