




UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO




LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE
ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE


SIC BOSCHETTO A TASSO
PRESSO MONTECAVALLO
IT53330021 (AB56)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000




SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra



COORDINATE VERTICI		
GAUSS-BOAGA FUSO EST		
VERTICI	N	E
NO	4762196	2350239
NE	4762196	2350618
SO	4766409	2350239
SE	4766409	2350618

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



--- Confine SIC proposto
--- Confine SIC vigente

LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 776 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 684 Ha

- 

6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Praterie a forasacco e cirquefoglia di Tommasini
Ass. *Potentilla cinerea-Drumetum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *potentillietosum cinerea* Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 11 Ha (1,6%)
- 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Pascolo xerico ad astragalo spinoso e seteria dei macereti
Ass. *Astragalus sempervirens-Seslerietum nitidae* Biondi & Ballesi 1995
6 - Praterie a forasacco comune e sonaglie comuni e palio rupestre
Ass. *Briza media-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballesi 1982
subass. *anthemistetosum alpinum* Catorci in Ballesi, Castagnari, Catorci & Fortunati 2000
6 - Praterie a forasacco comune e sonaglie comuni e festuca dei nardeti
Ass. *Briza media-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballesi 1982
subass. *festucetosum communis* Catorci, Gatti & Ballesi 2006
7 - Praterie aperte a seteria dei macereti
Ass. *Polygala majora-Seslerietum nitidae* Biondi, Ballesi, Allegrezza & Zuccarello 1995
8 - Praterie a forasacco e cirquefoglia di Tommasini
Ass. *Potentilla cinerea-Drumetum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *potentillietosum cinerea* Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 383 Ha (56%)
- 

9210* Faggeti dell'Appennino con *Taxus ed llex*
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Bosco termofilo, neutro-basilfo di faggio
Ass. *Lathyrus veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyrusveneti* Biondi et al. 2002
4 - Bosco microtermo, basilfo di faggio
Ass. *Cardamine itabellii-Fagetum sylvaticae* Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995
Superficie stimata dell'habitat 263 Ha (36,5%)
- 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
9 - Pascolo a ranuncolo del Pollino e fenarola violacea
Ass. *Seneccio scopoli-Ranunculetum pollinensis* Biondi & Ballesi 1995
subass. *plenagiagnetosum atratae*
Superficie stimata dell'habitat 7 Ha (1%)
- 

91L0 Querceti di rovere ilirici (*Erythronio-Carpinion*)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco di cerro
Ass. *Cercis sylvatica-Quercetum ceris* Catorci & Orsomanico 2001
Superficie stimata dell'habitat 20 Ha (2,9%)

--- Confine SIC proposto
--- Confine SIC vigente

