




UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO



LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE
ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC GOLA DELLA VALNERINA
- MONTE FEMÀ
IT53330023 (AB57)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)
SCALA 1:10.000

0 125 250 500

Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
E DI BOTANICA E ECOLOGIA

COORDINATE VERTICI
GAUSS-BOAGA
FUSO EST

VERTICI	N	E
NO	479780	226831
NE	479781	226833
SO	479781	226831
SE	479781	226833

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



--- Contorno SIC proposto

--- Contorno SIC vigente

LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 3544 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 2116 Ha

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Seton abiti

si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Praterie a forasacco e betulla purpurea
Ass. Asperula purpurea-Brometum erecti Biondi & Ballei ex Biondi, Ballei, Allegrezza & Zuccarelli 1995
Superficie stimata dell'habitat 3 Ha (0,1%)

6220* Periconi substepici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodetea

si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Praterie a forasacco e betulla purpurea
Ass. Asperula purpurea-Brometum erecti Biondi & Ballei ex Biondi, Ballei, Allegrezza & Zuccarelli 1995
13 - Praterie a forasacco e cinquefoglia di Tormiani
Ass. Potentilla cretica-Brometum erecti Biondi, Piroi & Gubellini 2004
subass. potentillaeum creticae Biondi et al. 2004
14 - Praterie con scelerite di macerati e forasacco
Ass. Sceleritum rubra-Brometum erecti Biondi & Covarelli 1998
Superficie stimata dell'habitat 7 Ha (0,3%)

6210* Formazioni erbose secche semiriparie e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (Indicibile Fortius di Corridori)

comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Praterie aperte al forasacco comune e scelerite dei macerati
Ass. Asperula purpurea-Brometum erecti Biondi & Ballei ex Biondi, Ballei, Allegrezza & Zuccarelli 1995
7 - Praterie aperte al forasacco comune e scelerite dei macerati
Ass. Asperula purpurea-Brometum erecti Biondi & Ballei ex Biondi, Ballei, Allegrezza & Zuccarelli 1995
8 - Praterie a forasacco e betulla purpurea
Ass. Asperula purpurea-Brometum erecti Biondi & Ballei ex Biondi, Ballei, Allegrezza & Zuccarelli 1995
9 - Praterie a forasacco comune e scelerite comuni
Ass. Brometum erectum-Brometum erecti Biondi & Covarelli con Biondi & Ballei 1982
subass. brometum erectum Biondi, Piroi & Gubellini 2004
10 - Praterie a forasacco comune e scelerite comuni a fetuccia dei macerati
Ass. Brometum erectum-Brometum erecti Biondi & Covarelli con Biondi & Ballei 1982
subass. brometum erectum Biondi, Piroi & Gubellini 2004
11 - Praterie a forasacco comune e forasacco trattato
Ass. Cirsium lanceolatum-Brometum erecti Biondi, Ballei, Allegrezza, Gustin & Taffetani 1995
12 - Praterie aperte a scelerite dei macerati
Ass. Pinguicula vulgaris-Brometum erecti Biondi, Ballei, Allegrezza & Zuccarelli 1995
13 - Praterie a forasacco e cinquefoglia di Tormiani
Ass. Potentilla cretica-Brometum erecti Biondi, Piroi & Gubellini 2004
subass. potentillaeum creticae Biondi et al. 2004
14 - Praterie con scelerite dei macerati e forasacco
Ass. Sceleritum rubra-Brometum erecti Biondi & Covarelli 1998
Superficie stimata dell'habitat 1133 Ha (33,5%)

91A1* Boschi orientali di quercia bianca

comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Boschi di roverella
Ass. Pseudotsuga veneta-Quercetum pubescentis (Ubaldi, Pucci, Speranza & Zanotti 1984) Ubaldi 1988
subass. pseudotsugae venetae (Ubaldi, Pucci, Speranza & Zanotti 1984) Ubaldi 1988
5 - Boschi di roverella con corno di capra e foglie esseri
Ass. Corylus rostrata-Quercetum pubescentis Biondi, Piroi & Averna 1982
Superficie stimata dell'habitat 305 Ha (14,4%)

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
15 - Boschi ripariali a salice bianco saldato con ontano nero
Ass. Salicetum albae laevis 1925
subass. albae salicetum albae
Superficie stimata dell'habitat 9 Ha (0,4%)

9210* Faggeti dell'Appennino con Tanneo ed Ilex

comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Boschi termofili, neutro-basofili di faggio
Ass. Lathyrus venetici-Fagietum sylvaticum Biondi, Casavecchia, Piroi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. lathyrus venetici Biondi et al. 2002
Superficie stimata dell'habitat 255 Ha (13,8%)

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine


comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
16 - Praterie a forasacco di Praterie e forasacco subalpino
Ass. Senecio squalidus-Furcraea polifolia Biondi & Ballei 1995
subass. alpinum polifoliae
Superficie stimata dell'habitat 111 Ha (5,2%)

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus robur

comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Boschi di leccio
Ass. Calluna vulgaris-Quercetum ilex Biondi & Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignatelli & Venanzoni 2002
subass. callunae vulgaris-Quercetum ilex Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
6 - Boschi di leccio
Ass. Calluna vulgaris-Quercetum ilex Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
subass. callunae vulgaris-Quercetum ilex Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 255 Ha (12,1%)

--- Contorno SIC proposto

--- Contorno SIC vigente



The main map displays the distribution of various habitats across the Gola della Valnerina area, with color-coded regions and topographic contours. The map includes labels for various locations such as Monte Femà, Monte Murolo, Monte Carbone, and Monte Fergalella. The map also shows the distribution of various habitats, including 6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Seton abiti, 6220* Periconi substepici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodetea, 6210* Formazioni erbose secche semiriparie e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (Indicibile Fortius di Corridori), 91A1* Boschi orientali di quercia bianca, 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 9210* Faggeti dell'Appennino con Tanneo ed Ilex, 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, and 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus robur.

Allegato cartografico al database GIS (software: ISE ArcGIS 9.0) PES/RES/308/01
Dipartimento Scienze Naturali e Produzioni Vegetali, Area Botanica
Facoltà di Agraria, Università Politecnica delle Marche
Rappresentazione e digitalizzazione: FOGLIA MONICA
Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Camerino

ASCONA_26/07/2009

Basi topografiche derivate da CTR 1:50000 Regione Marche, opportunamente ridimensionate