




UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO



LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC GOLA DI S. EUSTACHIO
IT53330016 (AB42)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000



Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST


AUTORI:

CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
SEZ. BOTANICA ED ECOLOGIA

COORDINATE VERTICI		
GAUSS-BOAGA FUSO EST		
VERTICI	N	E
NO	4787971	2366576
NE	4787971	2370174
SO	4782729	2366576
SE	4782729	2370174

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



--- Confine SIC proposto
--- Confine SIC vigente



LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 609 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 224 Ha

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
5 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (0,4%)

6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
5 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (0,4%)

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
5 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
6 - Prateria a forasacco comune e sonaglini comuni
Ass. *Briza mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballelli 1982
subass. *brizetosum mediae* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
7 - Prateria a forasacco comune e fiordaliso bratteato
Ass. *Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guttian & Taffetani 1986
Superficie stimata dell'habitat 58 Ha (25,9%)

91AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Bosco di roverella
Ass. *Rosio sempervirentis-Quercetum pubescentis* Biondi 1986
subass. *quercetosum pubescentis* Allegrezza et al. 2002
2 - Bosco di roverella con scolano
Ass. *Rosio sempervirentis-Quercetum pubescentis* Biondi 1986
subass. *colinetosum coggygiae* Allegrezza, Baldoni, Biondi & Taffetani 2002
3 - Bosco di roverella con ciliso a foglie sessili
Ass. *Cyrtio sessilifolii-Quercetum pubescentis* Biasi, Feoli & Avena 1982
Superficie stimata dell'habitat 96 Ha (42,9%)

91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Aino-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Bosco ripariale a salice bianco talvolta con ontano nero
Ass. *Salicetum albae* Isler 1928
subass. *alnetosum glutinosae*
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (0,4%)

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Bosco di leccio
Ass. *Cyclaminetosum hederifolii* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
subass. *cyclaminetosum hederifolii* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 67 Ha (29,9%)

--- Confine SIC proposto

--- Confine SIC vigente