




UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO

LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC MACCHIA DI MONTENERO IT53330012 (AB31) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000



Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:


CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
SEZ. BOTANICA ED ECOLOGIA

COORDINATE VERTICI		
GAUSS-BOAGA FUSO EST		
VERTICI	N	E
NO	4805985	2369893
NE	4805985	2374093
SO	4801728	2369893
SE	4801728	2374093

QUADRO D'UNIONE SEZIONI 1:10000



--- Confine SIC proposto
--- Confine SIC vigente



Allotimento cartografico ed elaborazioni GIS (software: ESRI ArcGis 9.0): Simone Pesaresi
Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali, Area Botanica
Facoltà di Agraria, Università Politecnica delle Marche

Fotointerpretazione e digitalizzazione: Monica Foglia
Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Camerino

Base topografica derivata da CTR 1:10000 Regione MARCHE, opportunamente rielaborata

ANCONA, 22/04/2009

LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 359 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 198 Ha

- 6210*** Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
 - 4 - *Prateria a forasacco* comune e sonaglini comuni
Ass. *Briza mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballelli 1982
subass. *brizetosum mediae* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
 - 5 - *Prateria a forasacco* comune e fiordaliso bratteato
Ass. *Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian & Taffetani 1986
Superficie stimata dell'habitat 9 Ha (4,5%)
- 91AA*** Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
 - 2 - Bosco di roverella
Ass. *Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti, 1984) Ubaldi 1988
subass. *peucedanetosum cervariae* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti, 1984) Ubaldi 1988
Superficie stimata dell'habitat 21 Ha (10,6%)
- 91E0*** Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
 - 6 - Bosco ripariale a salice bianco
Ass. *Salicetum albae* Issler 1926
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)
- 9340** Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
 - 1 - Bosco di leccio
Ass. *Cephalantho longifoliae-Quercetum ilicis* Biondi & Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignatelli & Venanzoni 2002
subass. *lathyretosum veneti* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
 - 3 - Bosco di leccio
Ass. *Cyclaminio hederifolii-Quercetum ilicis* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
subass. *cyclaminetosum hederifolii* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 168 Ha (84,8%)

--- Confine SIC proposto
--- Confine SIC vigente