

## **CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE**

SIC MONTE LETEGGE - MONTE D'ARIA IT53330011 (AB44) (DIRETTIVA 92/43/CEE)


SCALA 1:10.000

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST


CATORCI Andrea FOGLIA Monica GATTI Renata VITANZI Alessandra

COORDINATE VERTICI GAUSS-BOAGA FUSO EST

## **QUADRO D'UNIONE**



Confine SIC proposto Confine SIC vigente



## **LEGENDA** HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 1801 Ha AREA COPERTA DA HABITAT 996 Ha

6110\* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:

7 - Prateria a forasacco e stellina purpurea Ass. Asperulo purpureae-Brometum erecti Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995 Superficie stimata dell'habitat 21 Ha (2,1%)

6220\* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali: 7 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. Asperulo purpureae-Brometum erecti Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995 Superficie stimata dell'habitat 21 Ha (2,1%)

6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee) comprende le seguenti tipologie vegetazionali: 7 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995 8 - Prateria a forasacco e stellina purpurea e paléo rupestre
Ass. Asperulo purpureae-Brometum erecti Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995 subass. onobrychietosum viciifoliae Catorci, Gatti & Ballelli 2006

9 - Prateria a forasacco comune e sonaglini comuni Ass. *Brizo mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballelli 1982 subass. *brizetosum mediae* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004

10 - Prateria a forasacco comune e sonaglini comuni e covetta dei prati
Ass. *Brizo mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli corr. Biondi & Ballelli 1982 11 - Prateria a forasacco comune e fiordaliso bratteato Ass. Centaureo bracteatae-Brometum erecti Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian & Taffetani 1986

Superficie stimata dell'habitat 750 Ha (75,3%) 91AA\* Boschi orientali di quercia bianca comprende le seguenti tipologie vegetazionali:

Ass. Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi 1986 subass. cotinetosum coggygriae Allegrezza, Baldoni, Biondi & Taffetani 2002

4 - Bosco di roverella 4 - Bosco di roverella
Ass. Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988
subass. peucedanetosum cervariae (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988
5 - Bosco di roverella con citiso a foglie sessili
Ass. Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis Blasi, Feoli & Avena 1982

Superficie stimata dell'habitat 163 Ha (16,4%) 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia comprende le seguenti tipologie vegetazionali:

Ass. Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis Biondi & Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignatelli & Venanzoni subass. lathyretosum veneti Biondi, Casavecchia & Gigante 2003

6 - Bosco di leccio
Ass. Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003 subass. cyclaminetosum hederifolii Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 39 Ha (3,9%)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco di cerro con faggio
Ass. Aceri obtusati-Quercetum cerris Ubaldi & Speranza 1982 subass. fagetosum sylvaticae Allegrezza 2003 Superficie stimata dell'habitat 2 Ha (0,2%)

Confine SIC proposto

Fotointerpretazione e digitalizzazione: FOGLIA MONICA Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Camerino ANCONA, 08/05/2009