



UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLA MARCHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO

LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC MONTE PENNINO - SCUROSA IT53330020 (AB47) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000

0 125 250 500 Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST


AUTORI:

CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
SEZ. BOTANICA ED ECOLOGIA

COORDINATE VERTICI	
GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N E
NO	4779598 2349913
NE	4779598 2353772
SE	4772040 2353772
SO	4772040 2353772

QUADRO D'UNIONE SEZIONI 1:10000



— Confine SIC proposto — Confine SIC vigente

LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 2794 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 1373 Ha

6110* Formazioni erbose calciose rupeistiche o basofile dell'Alysso-Sedion albi
si rivisitano nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. Alysso-Sedion albi Biondi & Balleri ex Biondi, Balleri, Allegrezza & Zuccarello 1995
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

6220* Perorsi substepicoli di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea
si rivisitano nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. Alysso-Sedion albi Biondi & Balleri ex Biondi, Balleri, Allegrezza & Zuccarello 1995
5 - Prateria a forasacco e cipressoglia di Tormansini
Ass. Poetocarpion cypriogliae Biondi & Balleri ex Biondi, Balleri, Allegrezza & Zuccarello 2004
Subass. Poetocarpion cypriogliae Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 4 Ha (0.3%)

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (notevole floritura di Orchidee)
comprendono le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Prateria a forasacco e cipressoglia di Tormansini
Ass. Astragalio semperfervens-Seslerietum nitidae Biondi & Balleri 1995
2 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. Alysso-Sedion albi Biondi & Balleri ex Biondi, Balleri, Allegrezza & Zuccarello 1995
3 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. Poetocarpion cypriogliae Biondi & Balleri ex Biondi, Balleri, Allegrezza & Zuccarello 1995
4 - Prateria a forasacco comune e salsogno comune e festuca del nardino
Ass. Brachypodion pratense Biondi & Balleri ex Biondi, Balleri, Allegrezza & Zuccarello 1995
5 - Prateria a forasacco e cipressoglia di Tormansini
Ass. Poetocarpion cypriogliae Biondi & Balleri ex Biondi, Balleri, Allegrezza & Zuccarello 2004
Subass. Poetocarpion cypriogliae Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 452 Ha (32.9%)

9160* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
comprendono le seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Bosco riparato a salice bianco latifolia con ontano nero
Ass. Salicetum albae Ister 1928
7 - Bosco riparato a salice bianco latifolia con ontano nero
Ass. Salicetum albae Ister 1928
Superficie stimata dell'habitat 3 Ha (0.2%)

9210* Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
comprendono le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Bosco termofilo, neutr-basifilo di faggio
Ass. Fagetum sylvaticae Baldoni, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
Subass. Lathyrion veneti Biondi et al. 2002
Superficie stimata dell'habitat 914 Ha (66.6%)

— Confine SIC proposto
— Confine SIC vigente

