

**LR 6/2007 ART. 28**

# CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

**SIC MONTE RAGNOLO E MONTE META  
(VERSANTE OCCIDENTALE)  
IT53330001 (AB50)  
(DIRETTIVA 92/43/CEE)  
SCALA 1:10.000**




## Method

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST


**AUTORI:**  
CATORCI Andrea  
FOGLIA Monica  
GATTI Renata  
VITANZI Alessandra

| COORDINATE VERTICI |                         |         |
|--------------------|-------------------------|---------|
|                    | GAUSS-BOAGA<br>FUSO EST |         |
| VERTICI            | N                       | E       |
| NO                 | 4767423                 | 2371604 |
| NE                 | 4767423                 | 2378003 |
| SO                 | 4762181                 | 2371604 |
| SE                 | 4762181                 | 2378003 |

**QUADRO D'UNIONE  
SEZIONI 1:10000**



 Confine SIC proposto  Confine SIC vigente



**LEGENDA**  
**HABITAT 92/43/CEE**

AREA CARTOGRAFATA 1008 Ha  
AREA COPERTA DA HABITAT 747 Ha

6110\* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Session albi si rinvengono nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:  
5 - Prateria a forasacco e stellina purpurea  
Ass. *Asperula purpurea*-*Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995  
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

6220\* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:

- Praterà a forasacco e stelina purpurea
- *Ass. Asperula purpurea-Bromum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
- Praterà a forasacco e circonfuso di Tommasini
- *Ass. Potentilla cinerea-Bromum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004 subass. *potentilletum cinerea* Biondi et al. 2004
- Praterà a forasacco con sesteria dei macerici e forasacco
- *Ass. Sesterio nitida-Bromum erecti* Bruno e Biondi & Covarelli 1998

Superficie stimata dell'habitat 4 Ha (0.5%)

[illegible]

9210\* Faggeti dell'Appennino con *Taxus* ed *Ilex*  
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:  
2 - Bosco termofilo, neutro-basilfo di faggio  
Ass. *Lathyrus veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia  
subass. *lathyriflorum veneti* Biondi et al. 2002  
3 - Bosco microtermo, basilfo di faggio  
Ass. *Cardaminio kitaibellii-Fagetum sylvaticae* Ubaldi et al.  
Superficie stimata dell'habitat 50 Ha (6,7%)

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine  
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:  
11 - Pascolo a ranuncolo del Pollino e fienarola violacea  
Ass. *Senecio scopoli-Ranunculetum pollinensis* Biondi & Ballioli 199  
subass. *plantaginifolium atratae*  
Superficie stimata dell'habitat 79 Ha (10,6%)

Confine SIC proposals

Confine SIC vigente