UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI

GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC PIANA DI PIORACO IT53330010 (AB43) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000

0 125 250 500
Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
SEZ. BOTANICA ED ECOLOGIA

COORDINATE VERTICI		
	GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N	E
NO	4786334	2344668
NE	4786334	2355771
SO	4779691	2344668
SE	4779691	2355771

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



Confine SIC proposto
Confine SIC vigente

LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 599 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 100 Ha

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpurae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpurae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpurae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
4 - Prateria a forasacco comune e sinaglini comuni
Ass. *Brizo mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli con: Biondi & Ballelli 1982
subass. *brometosum mediae* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
5 - Prateria a forasacco comune e fiordaliso brattoato
Ass. *Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian & Taffetani 1986
Superficie stimata dell'habitat 16 Ha (16%)

91AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Bosco di roverella
Ass. *Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988
subass. *peucedanetosum cervariae* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988
2 - Bosco di roverella con ciliso a foglie sessili
Ass. *Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis* Blasi, Feoli & Avena 1982
Superficie stimata dell'habitat 54 Ha (54%)

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Bosco riparale a salice bianco talvolta con ontano nero
Ass. *Salicetum albae* Issler 1926
subass. *alnetosum glutinosae*
Superficie stimata dell'habitat 30 Ha (30%)

Confine SIC proposto
Confine SIC vigente



Allestimento cartografico ed elaborazione GIS (software: ESRI ArcGis 9.0): PESARESI SIMONE
Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali, Area Botanica
Facoltà di Agraria, Università Politecnica delle Marche

Fotointerpretazione e digitalizzazione: FOGLIA MONICA
Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Camerino

ANCONA, 02/07/2009

Base topografica derivata da CTR 1:10000 Regione MARCHE, opportunamente rielaborata