




UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO



LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE
ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC RIO TERRO
IT53330003 (AB49)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000

0125250500

Metri


SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
SEZ. BOTANICA ED ECOLOGIA

COORDINATE VERTICI	
GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N E
NO	4768555 2374410
NE	4768555 2380990
SO	4761512 2374410
SE	4761512 2380990

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



 Confine SIC proposto

 Confine SIC vigente

LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 1812 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 598 Ha

 6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
7 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperula purpureae-Brometum erecti* Biondi & Balletti, Allegrezza & Zuccarelli 1995
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

 6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
7 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperula purpureae-Brometum erecti* Biondi & Balletti, Allegrezza & Zuccarelli 1995
12 - Prateria a forasacco e cinguettiglia di Tommasi
Ass. *Potentilla cinerea-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *portendiletosum cinerea* Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 1 Ha (0,2%)

 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Prescio vetico ad estraglio spinoso e vesetia dei macrelli
Ass. *Astragalus sempervirens-Seslerietum nitidae* Biondi & Balletti 1995
6 - Prato-pascolo a trifoglio montano e covella dei prati con gentianella napoletana
Ass. *Polygonum vulgare-Trifolium montanum* Huska et al., in Francalancia et al., 1981
subass. *gentianellatantum columae* Calosci, Gatti & Balletti 2006
7 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperula purpureae-Brometum erecti* Biondi & Balletti, Allegrezza & Zuccarelli 1995
8 - Prateria a forasacco comune e sonagli comuni
Ass. *Briza media-Brometum erecti* Bruino in Bruino & Covarelli corr. Biondi & Balletti 1982
subass. *brizetum mediae* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
9 - Prateria a forasacco comune e sonagli comuni e festuca dei nardelli
Ass. *Briza media-Brometum erecti* Bruino in Bruino & Covarelli corr. Biondi & Balletti 1982
subass. *festucetum communis* Calosci, Gatti & Balletti 2006
10 - Prateria a forasacco comune e fordaio brattato
Ass. *Centaurea bracteata-Brometum erecti* Biondi, Balletti, Allegrezza, Guttan & Taffetani 1986
11 - Prateria aperta a vesetia dei macrelli
Ass. *Polygala major-Seslerietum nitidae* Biondi, Balletti, Allegrezza & Zuccarelli 1995
12 - Prateria a forasacco e cinguettiglia di Tommasi
Ass. *Potentilla cinerea-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *portendiletosum cinerea* Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 238 Ha (36,8%)

 51AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Bosco di roverella
Ass. *Peucedano cernuae-Quercetum pubescentis* Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti 1984) Ubaldi 1988
subass. *peucedanetosum cernuae* Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti 1984) Ubaldi 1988
Superficie stimata dell'habitat 149 Ha (24,9%)

 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnus incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
13 - Bosco ripariale a salice bianco talvolta con ontano nero
Ass. *Salicetum albae* Isler 1926
subass. *alnetosum glutinosae*
Superficie stimata dell'habitat 12 Ha (2%)

 9210* Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco termofilo, neutro-basifilo di faggio
Ass. *Lathyrus veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyrifoliosum veneti* Biondi et al. 2002
5 - Bosco micromerico, basifilo di faggio
Ass. *Cardinus strobilatus-Fagetum sylvaticae* Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995
Superficie stimata dell'habitat 181 Ha (30,3%)

 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Arbusteto di ginestra e ciro e foglie secchi con ginostro rosso
Ass. *Spartium junceum-Cytisus exaltatus* Biondi, Allegrezza & Guttan 1988
var. a *Juniperus oxycedrus*
Superficie stimata dell'habitat 2 Ha (0,3%)

 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
14 - Pascolo a ranuncolo dei Pollini e fienarola videacea
Ass. *Gentianopsis-Alanuncetum pollicinae* Biondi & Balletti 1995
subass. *plantaginetosum aratae*
Superficie stimata dell'habitat 15 Ha (2,5%)

 Confine SIC proposto

 Confine SIC vigente

