




UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLA PRODUZIONE VEGETALE



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO AMBIENTE E
PAESAGGIO



LR 6/2007 ART. 28

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE
ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC VAL DI FIBBIA
- VALLE DELL'ACQUASANTA
IT53330002 (AB55)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)
SCALA 1:10.000

0125500

0

125

250

500

Metri


SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
CATORCI Andrea
FOGLIA Monica
GATTI Renata
VITANZI Alessandra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
SEZ. BOTANICA ED ECOLOGIA

COORDINATE VERTICI		
VERTICI	N	E
NO	4755219	236533
NE	4755219	2376427
SO	4755889	236533
SE	4755889	2376427

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



 Confine SIC proposto

 Confine SIC vigente

LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 3179 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 2095 Ha



6220*
Persone substepici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
19. Praterie a fascicolo e cinghiglia di Formica
Ass. Potentillo onerose-bronzei Brondi, Piro & Gubellini 2004
subass. potentillorum onerose Brondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 4 Ha (0,2%)



6210*
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brionetalia) (invertebrate foratura di Orthocentrus)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1. Praterie aperte al tallaggio naturale e sistema dei macerati
Ass. Arumago sempervirens-Sedum melleo Brondi & Ballelli 1995
11. Praterie aperte al tallaggio naturale e cespugli di prati
Ass. Filipendula vulgaris-Tribulus montani Frosini et al. in Francalancia et al., 1981
12. Praterie a fascicolo comune e cinghiglia comune
Ass. Dico media-bronzei erosi Brondi & Bonelli & Covarelli con: Brondi & Ballelli 1992
13. Praterie a fascicolo comune e cinghiglia comune e boscaglia dei macerati
Ass. Dico media-bronzei erosi Brondi & Bonelli & Covarelli con: Brondi & Ballelli 1992
14. Praterie aperte a sistema dei macerati
Ass. Filipendula vulgaris-Sedum melleo Brondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
15. Praterie a fascicolo e cinghiglia di Formica
Ass. Potentillo onerose-bronzei Brondi, Piro & Gubellini 2004
subass. potentillorum onerose Brondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 530 Ha (25,3%)



6180*
Foreste di versanti, ghiaioni e valli del Tilio-Acerion
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
5. Bosco di acero di monte, ligio notano e altro di montagna
Ass. Acerium obtusum-pseudoplatani Brondi, Casavecchia, Piro, Allegrezza & Baldoni 2002
Superficie stimata dell'habitat 5 Ha (0,2%)



61A0*
Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3. Bosco di roverella
Ass. Quercetum onerose-Quercetum pubescentis Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti, 1984 Ubaldi 1988
subass. pseudoplatani onerose Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti, 1984 Ubaldi 1988
4. Bosco di roverella con cile e foglie rosse
Ass. Cyclo aceris-Quercetum pubescentis Blas, Foch & Avena 1982
Superficie stimata dell'habitat 69 Ha (2,3%)



6210*
Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
5. Bosco vermiglio, medio-basso di foglio
Ass. Lathyrus veneti-Fagum sylvaticae Brondi, Casavecchia, Piro, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. antirrhinum erosi Brondi et al. 2002
7. Bosco micromerco, basso di foglio
Ass. Castanetum subass-Fagum sylvaticae Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995
8. Bosco micromerco, basso di foglio
Ass. Castanetum subass-Fagum sylvaticae Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995
subass. castanetum subass-Fagum sylvaticae Brondi, Piro & Gubellini 2004
Superficie stimata dell'habitat 947 Ha (45,2%)



6170
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
16. Praterie discontinue a versanti dell'Appennino
Ass. Deschietum apenninae Miglacco 1970 em. Bonin 1978
17. Praterie in arvenza del Puleto e Sarnata valdese
Ass. Deschietum scopuliflorum-poliflorae Brondi & Ballelli 1995
subass. gladioliflorae erose
Superficie stimata dell'habitat 533 Ha (25,4%)



6140
Ghiacciai del Mediterraneo orientale
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
10. Praterie discontinue a festuca dei ghiaini con pino
Ass. Galio magellanicus-Festuca dimorpha Foch & Chappell 1983
var. a Brachypodium germanicum
11. Praterie discontinue a festuca dei ghiaini e perennia
Ass. Galio magellanicus-Festuca dimorpha Foch & Chappell 1983
subass. galio-magellanicus di Puleto, Puleto, Foch & Basi 2004
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)



6340
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
6. Bosco di medio
Ass. Quercetum ilex-Quercetum ilex Brondi, Casavecchia & Gigante 2003
subass. cyclomictum ilex Brondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 7 Ha (0,3%)

 Confine SIC proposto

 Confine SIC vigente

Abbinamento cartografico ed elaborazione GIS (software: ESRI ArcGIS 9.0): PISABESI SIMONE
Dipartimento Scienze Naturali e Produzione Vegetale, Area Botanica
Facoltà di Agraria, Università Politecnica delle Marche

Base topografica derivata da CTR 1:50000 Regione Marche, opportunamente ridimensionata

Universit  Politecnica delle Marche
Dipartimento di Scienze Ambientali, Universit  degli Studi di Camerino

ANCONA, 20/07/2009