



UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
ASSESSORATO AMBIENTE
POSIZIONE DI FUNZIONE
BIODIVERSITA' E RETE ECOLOGICA REGIONALE

Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC MONTE S. SILVESTRO MONTE ERCOLE IT5310020 (AB04) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000

0125250500



Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
BIONDI Edoardo
ANGELINI Elia
CASAVECCHIA Simona
PESARESÌ Simone
VENTRONE Fulvio

COORDINATE VERTICI	
GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N E
NO	4862049 2299934
NE	4862049 2302109
SO	4857185 2299934
SE	4857185 2302109

Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2005-2006



LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 1445 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 549 Ha



6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Prateria discontinua a cornetta minima e astragalo rosato
Ass. Coronillo riviniae-Astragalum montessuianum Biondi & Balletti in Biondi, Balletti & Principi 1985
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)



6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Prateria a forasacco comune e fordisso brattellato
Ass. Centaureo bracteae-Brionium erecti Biondi, Balletti, Allegranza, Guitani & Taffetani 1986
9 - Prateria a forasacco e cornetta di masquillieri
Ass. Coronillo riviniae-Astragalum montessuianum Biondi & Balletti in Biondi, Balletti & Principi 1985
Superficie stimata dell'habitat 45 Ha (8,2%)



91Aa* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco di roverella
Ass. Pseudotsuga cervinae-Quercetum pubescentis (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti 1984) Ubaldi 1988
subass. pseudotsugae cervinae (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti 1984) Ubaldi 1988
Superficie stimata dell'habitat 348 Ha (63,4%)



92B0 Foreste di Castanea sativa
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
7 - Bosco di castagno
Ass. Melanorrhoea italica-Castanetum sativae Huska 1988
Superficie stimata dell'habitat 90 Ha (16,4%)



92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco
Aggr. a Populus nigra o Populus alba o Salix alba
10 - Bosco ripariale a pioppo nero
Ass. Salix albae-Populetum nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936
subass. populeto-nigrae (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936
Superficie stimata dell'habitat 35 Ha (6,4%)



91M0 Foreste pannonicobalcaniche di quercia cerro-quercia sessile
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Bosco di cerro
Ass. Aceri obtusae-Quercetum cerri Ubaldi & Speranza 1982
subass. aceretum obtusae Ubaldi & Speranza 1982
Superficie stimata dell'habitat 12 Ha (2,2%)



HABITAT DISPOSTI A MOSAICO
5 - Mosaico di vegetazione erbacea dei greti ghiaiosi
si rinvergono i seguenti habitat:
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p e Bidens p.p.
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Formazione erbacea terofitica a nappola italiana
Ass. Polygonum lapathifolium-Xanthoxylum italici Priola & Rossetti 1974
Vegetazione terofitica a poligono mite e forficina comune
Ass. Bidens-Polygonum mits (Rohd 1951) Tuxen 1979
Superficie stimata dell'habitat 3 Ha (0,5%)



6 - Mosaico di vegetazione dei microboschi pionieri dei greti ghiaiosi
si rinvergono i seguenti habitat:
3240 Fiumi alpini a vegetazione ripariale legnosa a Salix elaeagnos
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
Arbusteto a ginestra comune e olivella spinosa con salice ripaiolo
Ass. Sclero juncei-Hippophaetum maritima Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997
subass. salicetum elaeagni Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997
Microbosco a salice ripaiolo
Ass. Salicetum elaeagni Hag. 1916 ex Jenik 1955
Superficie stimata dell'habitat 16 Ha (2,9%)



Confine SIC vigente



Confine SIC proposto