



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
ASSESSORATO AMBIENTE
POSIZIONE DI FUNZIONE
BIODIVERSITÀ E RETE
ECOLOGICA REGIONALE


Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC SETTORI SOMMITALI MONTE CARPEGNA E COSTA DEI SALTI IT5310005 (AB11) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000



Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST



AUTORI:

BIONDI Edoardo
ASPREA Simone
CASAVECCHIA Simona
PARADISI Luca
PESARESÌ Simone

Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2007-2008

COORDINATE VERTICI		
GAUSS-BOAGA FUSO EST		
VERTICI	N	E
NO	4856637	2303166
NE	4856637	2308116
SO	4852235	2303166
SE	4852235	2308116

QUADRO D'UNIONE SEZIONI 1:10000



LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 916 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 396 Ha

- 6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
9 - Prateria discontinua a sesleria italiana
Ass. *Valeriano montanae-Seslerietum italicae* Ubaldi 1974
Superficie stimata dell'habitat 7 Ha (1,8%)
- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Prateria a forasacco comune e fiordaliso bratteato
Ass. *Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballesi, Allegrezza, Guitian & Taffetani 1986
7 - Prateria a forasacco comune e fiordaliso bratteato con falasco
Ass. *Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballesi, Allegrezza, Guitian & Taffetani 1986
var. a *Brachypodium rupestre*
8 - Prateria a forasacco e ononide di masquillieri
Ass. *Ononido masquillieri-Brometum erecti* Biondi et al. 1988
9 - Prateria discontinua a sesleria italiana
Ass. *Valeriano montanae-Seslerietum italicae* Ubaldi 1974
Superficie stimata dell'habitat 290 Ha (73,2%)
- 91AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
5 - Bosco di roverella
Ass. *Paucedano cervinae-Quercetum pubescentis* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti, 1984) Ubaldi 1988
subass. *peucedanetosum cervinae* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti, 1984) Ubaldi 1988
Superficie stimata dell'habitat 8 Ha (2%)
- 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Aino-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Formazioni a pioppo tremolo e pioppo bianco
Aggr. a *Populus tremula* e *Populus alba*
Superficie stimata dell'habitat 10 Ha (2,5%)
- 9210* Faggeti dell'Appennino con *Taxus ed illex*
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco termofilo, neutro-basilfo di faggio
Ass. *Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyretosum veneti* Biondi et al. 2002
Superficie stimata dell'habitat 58 Ha (14,6%)
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Arbusteto di ginestra e citiso a foglie sessili con abbondante ginepro comune
Ass. *Spartio juncea-Cytisetum sessilifolii* Biondi, Allegrezza & Guitian 1988
var. a *Juniperus communis ssp. communis*
Superficie stimata dell'habitat 23 Ha (5,8%)
- 91M0 Foreste pannonic-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Bosco di cerro
Ass. *Aceri obtusati-Quercetum cerris* Ubaldi & Speranza 1982
subass. *acoretosum obtusati* Ubaldi & Speranza 1982
Superficie stimata dell'habitat 2 Ha (0,1%)

- Confine SIC vigente
- Confine SIC proposto