



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
AMBIENTALI
E DELLE PRODUZIONI VEGETALI



GIUNTA REGIONE MARCHE
ASSESSORATO AMBIENTE
POSIZIONE DI FUNZIONE
BIOVERSITA' E RETE
ECOLOGICA REGIONALE

Progetto di rete ecologica
della Regione Marche
(R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE
ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC VALLE AVELLANA
IT5310014 (AB08)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000
0 125 250 500
Metri


SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
BIONDI Edoardo
ANGELINI Elia
CASAVECCHIA Simona
PARADISI Luca
PESARESÌ Simone

COORDINATE VERTICI		
GAUSS-BOAGA FUSO EST		
VERTICI	N	E
NO	4861240	2318989
NE	4861240	2324965
SO	4853393	2318989
SE	4853393	2324965

Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2004-2005

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 1717 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 242 Ha

-  6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Prateria a forasacco comune e foraticcio bruciato
As. Centaureo bracteatus-Brometum erecti Biondi, Ballesi, Allegrezza, Guitan & Taffetani 1986
5 - Prateria a forasacco comune e foraticcio bruciato con falasco
As. Centaureo bracteatus-Brometum erecti Biondi, Ballesi, Allegrezza, Guitan & Taffetani 1986
var. a Brachypodium rupestre
Superficie stimata dell'habitat 2 Ha (0,8%)
-  6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Prateria a forasacco comune e foraticcio bruciato
As. Centaureo bracteatus-Brometum erecti Biondi, Ballesi, Allegrezza, Guitan & Taffetani 1986
5 - Prateria a forasacco comune e foraticcio bruciato con falasco
As. Centaureo bracteatus-Brometum erecti Biondi, Ballesi, Allegrezza, Guitan & Taffetani 1986
var. a Brachypodium rupestre
6 - Prateria a forasacco e anemone di maquis
As. Onoclea maritima-Brometum erecti Biondi et al. 1988
Superficie stimata dell'habitat 44 Ha (16,2%)
-  91AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Bosco di roverella con chiego
As. Ruscus aculeatus-Quercetum subserotens Biondi 1986
subass. prunetorum var. subass. nova
Superficie stimata dell'habitat 138 Ha (57%)
-  6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megafortite idrofite
dove falisco e più ampio di rinviene si rinviene a mosaico con le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pino nero, pino bianco e salice bianco
Agg. a Populus nigra o Populus alba o Salix alba
Superficie stimata dell'habitat 5 Ha (2,1%)
-  92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pino nero, pino bianco e salice bianco
Agg. a Populus nigra o Populus alba o Salix alba
Superficie stimata dell'habitat 47 Ha (15,4%)
-  91M0 Foreste pannoniche-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco di cerro con ceretta comune
As. Acer obtusilobus-Quercetum sessile Ballesi & Speranza 1982
subass. serrulatusum montanae Ballesi & Speranza 1982
Superficie stimata dell'habitat 6 Ha (2,2%)

-  Confine SIC proposto
-  Confine SIC vigente

