

Marina ci chiede:

Salve, io ho un gatto maine coon di 9 mesi al quale ho fatto fare l'anno scorso il vaccino contro la leucemia, visto che ha anche contatti con l'esterno. Purtroppo recentemente ho avuto una bruttissima esperienza: il mio precedente gatto è morto in seguito a un brutto sarcoma tra le scapole che dopo il primo intervento chirurgico è diventato ancora più invasivo e aggressivo, deformatogli e ulcerandogli tutta la schiena in breve tempo e portandolo alla morte.

Probabilmente il sarcoma era dovuto proprio a una reazione del vaccino contro la leucemia. Per questo adesso col mio nuovo gatto ho insistito per far fare questo tipo di vaccino sulla "coscetta" anziché tra le scapole. Però mi viene un dubbio: quest'anno dovrò farlo vaccinare nuovamente e non so se conviene fargli fare il vaccino sulla stessa coscia o nell'altra. Perché facendola nell'altra forse ci sarebbe meno accumulo di alluminio, e quindi forse converrebbe alternarle, ma d'altra parte ci sarebbe il rischio che possa avere reazioni avverse in entrambe le zampe!! Quindi volevo un consiglio su come e dove far fare questo tipo di vaccino. Grazie!

Marina

Gentile Marina

Il sarcoma iniezione indotto è una temibile complicazione secondaria a terapie o profilassi iniettive. Non è ancora chiara l'eziologia precisa, cioè la causa per cui alcuni gatti sviluppano il tumore. Per questo motivo non c'è una probabilità statisticamente più alta che il gatto presenti la neoplasia in seguito a profilassi nei confronti della Felv anche se la casistica clinica tende a ricalcare la sua esperienza.

Il consiglio pratico è quello di eseguire l'inoculazione del vaccino per la prevenzione della Felv sempre sulla stessa coscia onde evitare di avere una possibile reazione neoplastica su entrambi gli arti, cosa che renderebbe la gestione chirurgica del caso oltremodo difficoltosa.

Cordialmente

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ancona